



34

Découvrez les Villas

En savoir plus : www.villasdelanse.com


N° 34 – Tourterelle triste



La Tourterelle triste se nourrit presque exclusivement de graines qui constituent 99 % de son régime. Elle consomme rarement des escargots ou des insectes. En général, elle remplit son jabot et va ensuite se poser plus loin pour digérer. La Tourterelle triste avale souvent du gravier fin ou du sable ce qui facilite la digestion. Cette espèce cherche souvent sa nourriture au sol sous les mangeoires.

© Yvan Comeau

N° 34 - Chouette rayée




Le régime alimentaire de la Chouette rayée est constitué principalement de souris, d'écureuils, des renards et d'oiseaux. La Chouette rayée capture aussi des poissons.

La Chouette rayée chasse perchée aux cimes des arbres la nuit, ou en volant à travers les bois. Elle chasse généralement à l'aube ou au crépuscule, mais également durant les jours nuageux. Visible 4 saisons aux Villas de l'Anse.

© Yvan Comeau

N° 34 – Croissant du Grand-Pic – Le Grand-pic

40 à 49 cm



Moustache rouge du mâle

Le Grand-pic (*Dryocopus pileatus*) est :

- Gros comme une corneille d'Amérique (*Corvus brachyrhynchos*).
- Il a une huppe d'un rouge vif.
- Le mâle a une moustache rouge. Le femelle a la tête rouge sans moustache.
- Des grands trous ovales ou oblongs sur les arbres indiquent sa présence.
- Il mesure 40 à 49 cm de haut
- Les pics contribuent à l'écologie des forêts par la destruction de larves d'insectes.
- Les perforations attirent les colibris.
- Visible 4 saisons aux Villas de l'Anse